



SOCIETA' ITALIANA DI OFTALMOLOGIA LEGALE

(Sociale, Preventiva ed Ergonomica)

Iniezione di farmaci per via intravitreale

Iniezione di farmaci per via intravitreale

RACCOMANDAZIONI AL PAZIENTE

(ultimo aggiornamento giugno 2013)

- 1. Instillare nei giorni precedenti l'intervento il collirio antibiotico prescritto come da istruzioni.*
- 2. Dopo la mezzanotte del giorno che precede l'intervento si dovrà bere e mangiare moderatamente.*
- 3. Il giorno dell'intervento si dovranno assumere i farmaci abituali con mezzo bicchiere d'acqua.*
- 4. Portare con sé i farmaci assunti abitualmente durante l'intera giornata.*
- 5. La mattina dell'intervento rimuovere trucco, lenti a contatto.*
- 6. Venire accompagnati da una persona che possa guidare e riaccompagnare a casa il paziente operato.*
- 7. Se prescritto non sbendare l'occhio operato: al controllo oculistico del giorno successivo l'occhio verrà sbendato dal chirurgo.*
- 8. Il paziente operato deve medicare l'occhio operato instillando il collirio o applicando la pomata prescritta, secondo quanto prescrittogli.*
- 9. La pomata o il collirio va applicata/o tirando verso il basso la palpebra inferiore ed evitando di premere sull'occhio operato.*
- 10. La terapia va eseguita per tutto il periodo prescritto.*
- 11. Per i primi giorni successivi all'intervento è consigliabile, a scopo protettivo, usare un paio di occhiali scuri per evitare il fastidio alla luce (fotofobia).*
- 12. Non strofinare mai gli occhi; non piegarsi con la testa in basso*
- 13. Devono essere assolutamente evitati gli sforzi ed i lavori pesanti.*
- 14. In caso di dolore o annebbiamento della vista o qualsiasi altro problema telefonare o tornare subito per controllo.*
- 15. Attenersi scrupolosamente ai controlli consigliati*